ENGLISH

MD Medical Device

INDICATIONS FOR USE
Situations requiring inversion/eversion restriction. These may include mild to severe ankle sprains, chronic ankle instability, postcast and post-walker support, ankle injury rehabilitation and/or post-surgical use.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
Any serious incident with the device must be reported to the manufacturer and relevant authorities.
CAUTION: Never wear the device over an open wound.
WARNING: Do not overtighten the device. This can reduce blood flow (skin can turn blue, white or cold). Patients with reduced blood circulation (from e.g. diabetes) should consult a healthcare professional before use.
WARNING: If the device shows signs of damage or wear hindering normal function, the patient should stop using the device and contact a healthcare professional.

FITTING
The patient should always wear a cotton sock underneath the brace.
1. Spread the shells and place the heel on the heel strap to check fit.
2. Heel strap should fit snugly under the foot, be equal on both sides and the bottom of the stirrups should be slightly above the bottom of the foot.
3. If required, adjust the heel strap by lifting lower part of the liner and adjust the hook and loop tab. Further adjustments of the heel strap may be required if ankle swelling changes.
4. Hold stirrups up against the leg while wrapping the lower strap snugly around the brace.
5. Wrap top strap. Readjust straps as needed for a secure and comfortable fit.

DEUTSCH

MD Medizinprodukt

INDIKATIONEN
Verletzungen, die Inversions-/Eversionsbeschränkungen erfordern. Dies schließt u. a. leichte bis schwere Verstauchungen des Sprunggelenks, eine chronische Instabilität des Sprunggelenks, die Unterstützung nach Abliegen eines Gipsverbandes (Cast) oder einer Gehhilfe (Walker), die postraumatische Rehabilitation des Sprunggelenks und/oder nach einem chirurgischem Eingriff ein.

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN
Jeder schwerwiegende Vorfall in Bezug auf das Produkt muss dem Hersteller und den zuständigen Behörden gemeldet werden.
VORSICHT: Produkt niemals auf einer offenen Wunde tragen.
ACHTUNG: Produkt nicht zu eng anziehen. Dies kann die Durchblutung verringern (die Haut kann blau, weiß oder kalt werden). Patienten mit Durchblutungsstörungen (z. B. bei Diabetes) sollten vor der Anwendung einen Arzt befragen.
WARNUNG: Wenn das Produkt Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß aufweist, muss der Anwender die Verwendung des Produkts einstellen und sich an eine orthopädietechnische Fachkraft wenden.

ANPASSEN
Unter der Orthese sollte stets ein Baumwollstrumpf getragen werden.
1. Spreizen Sie die Schalen und platzieren Sie die Ferse auf dem Fersengurt, um den Sitz zu überprüfen.
2. Der Fersengurt muss eng unter dem Fuß sitzen und auf beiden Seiten gleich sein. Die Schalen sollten ein wenig oberhalb der Fußunterseite liegen.

HINWEIS: Eine Überhitzung des Gelpads kann zu Verbrennungen oder Schäden am Gelpad führen.

ENTSORGUNG
Das Produkt und die Verpackung müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

HAFTUNG
Dieser übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht gemäß den Anweisungen, gewartet wird, wenn das Produkt mit Komponenten anderer Hersteller zusammengesetzt wird oder wenn das Produkt nicht gemäß den Empfehlungen in Bezug auf Einsatzbedingungen, Anwendung oder Umgebung verwendet wird.

FRANÇAIS

MD Dispositif médical

INDICATIONS D'UTILISATION
Situations nécessitant une restriction d'inversion/éversion. Ces situations incluent, entre autres, une entorse de la cheville légère ou grave, une instabilité chronique de la cheville, une stabilisation après un plâtre ou une orthèse, une rééducation post-traumatique de la cheville et/ou une utilisation post-chirurgicale.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Tout incident grave concernant le dispositif doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.
ATTENTION : ne portez jamais le dispositif sur une plaie ouverte.
AVERTISSEMENT : ne serrez pas trop le dispositif. Cela peut réduire le flux sanguin (la peau peut devenir bleue, blanche ou froide). Les patients dont la circulation sanguine est réduite (par exemple à cause du diabète) doivent consulter un professionnel de santé avant d'utiliser l'orthèse.
AVERTISSEMENT : si le dispositif présente des signes de dommages ou d'usure l'empêchant de fonctionner normalement, le patient doit cesser de l'utiliser et contacter un professionnel de santé.

INSTRUCTIONS DE POSE
Le patient doit toujours porter une chaussette en coton sous l'orthèse.
1. Écartez les coques et placez le talon sur la sangle de talon pour vérifier l'ajustement.
2. La sangle de talon doit être parfaitement ajustée sous le pied, être égale des deux côtés et le bas des coques doit être légèrement au-dessus du bas du pied.
3. Si nécessaire, ajustez la largeur du talon en soulevant la partie inférieure du manchon et ajustez la languette auto-agrippante. D'autres ajustements de la sangle du talon peuvent être nécessaires si le gonflement de la cheville change.
4. Maintenez les étriers contre la jambe tout en enroulant bien la sangle inférieure autour de l'orthèse.
5. Enveloppez la sangle supérieure. Réajustez les sangles au besoin pour assurer un ajustement sûr et confortable.

Version Air uniquement
1. Si l'inconfort persiste après avoir repositionné l'orthèse et/ou réajusté les sangles, essayez de réajuster le volume de la doublure à air.

ESPAÑOL

MD Producto sanitario

INDICACIONES PARA EL USO
Situaciones que requieren restricción de la inversión/eversión. Estas pueden incluir esguinces de tobillo de leves a graves, inestabilidad crónica del tobillo, soporte tras retirada de una escayola o un Walker, rehabilitación de lesiones del tobillo y/o cirugía.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
Cualquier incidente grave con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a las autoridades pertinentes.
PRECAUCIÓN No use nunca el dispositivo directamente sobre una herida abierta.
ADVERTENCIA: No apriete en exceso el dispositivo. De lo contrario, reducir el flujo sanguíneo (la piel puede ponerse azul, blanca o fría). Los pacientes con circulación sanguínea deficiente (por ejemplo, debido a diabetes) deben consultar a un profesional sanitario antes usar el dispositivo.
ADVERTENCIA: Si el dispositivo muestra signos de daño o desgaste que dificultan sus funciones normales, el paciente debe dejar de usar el dispositivo y ponerse en contacto con un profesional sanitario.

AJUSTE
El paciente siempre debe usar el soporte con un calcetín de algodón por debajo.
1. Separe las carcasas y coloque el talón en la cincha de talón para verificar el ajuste.
2. La cincha del talón debe tirar uniformemente ajustada debajo del pie, debe quedar igual en ambos lados y la parte inferior de los estribos debe situarse ligeramente por encima de la parte inferior del pie.
3. Si es necesario, ajuste el ancho del talón levantando la parte inferior del revestimiento y ajustando la lengüeta de fijación adhesiva. Es posible que se requieran más ajustes de la cincha de talón si cambia la hinchazón del tobillo.
4. Sostenga los estribos contra la pierna mientras envuelve la cincha inferior bien ajustada alrededor del soporte.
5. Envuelva la cincha superior. Reajuste las cinchas según sea necesario para un ajuste seguro y cómodo.

Solo la versión de aire
1. Si las molestias persisten después de volver a colocar el soporte o reajustar las cinchas, intente reajustar el volumen del revestimiento de aire.
2. Vuelva a colocar la parte superior de las almohadillas de la cámara para ubicar la válvula de aire.
3. Infle el revestimiento de aire para obtener compresión y soporte adicionales. Introduzca el bulbo de aire e infíelo. No infle en exceso.

ITALIANO

MD Dispositivo medico

INDICAZIONI PER L'USO
Situazioni che richiedono la restrizione di inversione/eversione. Queste possono includere distorsioni della caviglia da lievi a severe, instabilità cronica della caviglia, supporto post-ingessatura e post-deambulatore, riabilitazione di lesioni alla caviglia e/o uso post-chirurgico.

ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA
Qualsiasi incidente grave con il dispositivo deve essere segnalato al produttore e alle autorità competenti.
ATTENZIONE: Non indossare mai il dispositivo direttamente su una ferita aperta.
AVVERTENZA: Non stringere eccessivamente il dispositivo. Ciò può ridurre il flusso sanguigno (la pelle può diventare blu, bianca o fredda). I pazienti con ridotta circolazione sanguigna (ad es., a causa del diabete) devono consultare un professionista sanitario prima dell'uso.
AVVERTENZA: in caso di danni o guasti al dispositivo, che ne impediscano il normale funzionamento, il paziente deve sospendere l'uso del dispositivo e contattare il professionista sanitario.

MONTAGGIO
Il paziente deve sempre indossare una calza di cotone sotto il tutore.
1. Stendere le conchiglie e posizionare il tallone sulla cinghia del tallone per verificarne la vestibilità.
2. La cinghia del tallone dovrebbe adattarsi perfettamente sotto il piede, essere uguale su entrambi i lati e la parte inferiore dei supporti dovrebbe essere leggermente sopra la parte inferiore del piede.
3. Se necessario, regolare la larghezza del tallone sollevando la parte inferiore del cuscinetto e regolando la linguetta della cinghia a strappo. Potrebbero essere necessarie ulteriori regolazioni della cinghia del tallone si gonfiore della caviglia cambia.
4. Tenere i supporti contro la gamba mentre si avvolge la cinghia inferiore attorno al tutore.
5. Avvolgere la cinghia superiore. Regolare nuovamente le cinghie secondo necessità per una vestibilità sicura e confortevole.

Solo versione ad aria
1. Se il disagio persiste dopo il riposizionamento del tutore e/o delle cinghie di regolazione, provare a regolare nuovamente il volume del cuscino d'aria.
2. Sollevare la parte superiore dei cuscini ad aria per localizzare la valvola.
a. Gonfiare il cuscino ad aria per aumentare la compressione e migliorare la funzione di sostegno. Inserire il tubo pneumatico incluso nella valvola e gonfiare. Non gonfiare eccessivamente.
b. Per rimuovere l'aria, inserire il tubo nella valvola ed premere delicatamente fino a raggiungere la pressione desiderata.
3. Riposizionare la valvola.

Solo versione gel
ATTENZIONE: il contatto diretto della pelle con il cuscinetto in gel riscaldato o raffreddato può provocare ustioni o congelamento. Utilizzare una calza di cotone sotto il dispositivo.
AVVISO: il surriscaldamento del cuscinetto in gel può causare ustioni o danni al cuscinetto in gel.
1. Rimuovere il cuscinetto in gel dal dispositivo e ispezionarlo. Non utilizzarlo se è danneggiato.
2. Per la terapia a freddo, raffreddare il cuscinetto in gel in un congelatore (20-60 min).
3. Per la terapia a caldo, riscaldare il cuscinetto in gel in acqua calda o in un forno a microonde (intervalli di 5 secondi con l'impostazione più bassa) fino a quando è caldo ma non troppo, in modo da poterlo tenere in mano.
4. Reinserire il cuscinetto in gel nel dispositivo e fissarlo.

PULIZIA E CURA
Lavare a mano in acqua fredda con detergente delicato. Non lavare in lavatrice né utilizzare un'asciugatrice. Non usare candeggina.

NORSK

MD Medisinsk utstyr

INDIKASJONER FOR BRUK
Situasjoner som krever begrensning av inversjon/eversjon. Disse kan omfatte milde til alvorlige ankelforstuinger, kronisk ustabilitet i ankel, støtte etter gips og bruk av rullator, rehabilitering av ankelskade og/eller bruk etter kirurgi.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Enhver alvorlig hendelse med enheten skal rapporteres til produsenten og relevante myndigheter.
FORSIKTIG: Bruk aldri enheten over et åpent sår.
ADVARSEL: Ikke stram enheten for hardt. Dette kan redusere blodsirkulasjonen (huden kan bli blå, hvit eller kald). Pasienter med redusert blodsirkulasjon (fra f.eks. diabetes) bør oppsøke helsepersonell før bruk.
ADVARSEL: Hvis enheten viser tegn til skade eller slitasje som hindrer dens normale funksjoner, må pasienten slutte å bruke enheten og kontakte helsepersonell.

TILPASNING
Pasienten skal alltid ha en bomullssokk under ortosen.
1. Spre skjellene og plasser hælen på hælstroppen for å sjekke passformen.
2. Hælstroppen skal passe godt under foten, være lik på begge sider og bunnen av sidebøylene skal være litt over fotens bunn.
3. Om nødvendig kan du justere hælbredden ved å løfte nedre del av foringen og justere borrelåsen. Ytterligere justeringer av hælremmen kan være nødvendig hvis hevelsen i ankelen endrer seg.
4. Hold stirrups opp mot beinet mens du vikler den nedre stroppen stramt rundt ortosen.
5. Fest toppstroppen. Juster stroppene etter behov for en sikker og behagelig passform.

Kun luftversjon
1. Hvis ubehaget vedvarer etter omplassering av ortosen og/eller justering av stropper, prøv å justere volumet av luftfôringen på nytt.

DANSK

MD Medicinsk enhed

INDIKATIONER FOR BRUG
Situationer med behov for reduceret drejning indad/udad af foden. Disse kan omfatte milde til svære ankelforstuninger, kronisk ustabil ankel, støtte efter fjernelse af gips eller ved opbar af brug af gangstativ, rehabilitering af ankelskade og/eller efter kirurgisk indgreb.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER
Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med enheden skal rapporteres til producenten og de relevante myndigheder.
FORSIGTIG: Brug aldrig enheden direkte på et åbent sår.
ADVARSEL: Stram ikke enheden for meget. Dette kan reducere blodgennemstrømningen (huden kan blive blå, hvid eller kold). Patienter med nedsat blodomløb (eksempelvis pga. diabetes) skal rådføre sig med en læge inden brug.
ADVARSEL: Hvis enheden viser tegn på skader eller slitage, der hindrer dens normale funktioner, skal patienten stoppe med at bruge enheden og kontakte en læge.

SMALTIMENTO
Il dispositivo e l'imballaggio devono essere smaltiti secondo le normative locali.

RESPONSABILITÀ
Ossur non si assume alcuna responsabilità qualora il dispositivo non venga conservato secondo le istruzioni d'uso, venga manomesso con componenti di altri produttori o venga utilizzato al di fuori delle condizioni d'uso, dell'applicazione o dell'ambiente raccomandati.

NORSK

MD Medisinsk utstyr

INDIKASJONER FOR BRUK
Situasjoner som krever begrensning av inversjon/eversjon. Disse kan omfatte milde til alvorlige ankelforstuinger, kronisk ustabilitet i ankel, støtte etter gips og bruk av rullator, rehabilitering av ankelskade og/eller bruk eller kirurgi.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Enhver alvorlig hendelse med enheten skal rapporteres til produsenten og relevante myndigheter.
FORSIKTIG: Bruk aldri enheten direkte på et åpent sår.
ADVARSEL: Ikke stram enheten for hardt. Dette kan redusere blodsirkulasjonen (huden kan bli blå, hvit eller kald). Pasienter med redusert blodsirkulasjon (f.eks. diabetes) bør oppsøke helsepersonell før bruk.
ADVARSEL: Hvis enheten viser tegn til skade eller slitasje som hindrer dens normale funksjoner, må pasienten slutte å bruke enheten og kontakte en lege.

Kun gelversjon
FORSIKTIG: Direkte hudkontakt med oppvarmet eller avkjølt gelpute kan føre til brannskader eller frostskader. Bruk en bomullssokk under enheten.
MERK: Overoppheting av gelputen kan føre til brannskader eller skade på gelputen.
1. Fjern gelputen fra enheten og inspiser den. Ikke bruk hvis den er skadet.
2. For kald terapi avkjøles gelputen i en fryser (20–60 min).
3. For varm terapi varmes gelputen i varmt vann eller i en mikrobølgeovn (5 sekunders intervaller ved laveste innstilling) til den er varm, men ikke for varm til å holde.
4. Sett gelputen tilbake i enheten og fest den.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Vask for hånd i kaldt vann med mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk vaskemaskin eller tørketrommel. Må ikke bleikes.

AVFALLSHÅNDTERING
Enheten og emballasjen må kastes i henhold til lokale forskrifter.

ERSTATNINGSANSVAR
Ossur påtar seg intet ansvar hvis enheten ikke vedlikeholdes som instruert, manipuleres med andre produsenters deler eller brukes utenfor anbefalte tilstander, bruksområder eller miljø.

SVENSKA

MD Medicinteknisk produkt

INDIKATIONER
Situationer som kräver begränsad inversion/eversion. Dessa kan inkludera lindriga till svåra fotledsdistorsioner, kronisk fotledsinstabilitet, stöd efter borttagning av gips och användning av kryckor, rehabilitering av fotledsskada och/eller postoperativ användning.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR
Alla allvarliga händelser med produkten måste rapporteras till tillverkaren och relevanta myndigheter.
VARNING: Använd aldrig ortosen direkt på ett öppet sår.
VARNING: Dra inte åt för hårt. Detta kan minska blodflödet (huden kan bli blå, vit eller kall). Patienter med nedsatt blodcirkulation (genom diabetes, t.ex.) bör rådgöra med vårdpersonal före användning.
VARNING: Om produkten visar tecken på skada eller om normala funktioner hindras av slitage ska patienten sluta använda produkten och kontakta en ortopedingenjör.

UTPROVNING
Patienten ska alltid bära en bomullsstrumpa innanför ortosen.
1. Sprid ut höljet och placera hälen på hälremmen för att kontrollera passformen. Hälremmen ska sitta åt under foten och vara lika lång på båda sidor, och stigbyglarnas undersida ska ligga något högre än fotens underkända.
2. Justera vid behov hälbredden genom att lyfta linerns nedre del och justera kardborrebandet. Ytterligare justeringar av hälremmen kan krävas om fotledens svullnad förändras.
4. Håll upp stigbyglarna mot benet medan du virar den nedre remmen tätt runt ortosen.
5. Vira dive evre remmen. Justera remmarna efter behov för en säker och bekväm passform.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MD Ιατροτεχνολογικό προϊόν

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Καταστάσεις κατά τις οποίες απαιτείται περιορισμός αναστροφής/εκστροφής. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ήπιους έως σοβαρούς διαστρέμματα αστραγάλου, χρόνια αστάθεια αστραγάλου, υποστήριξη μετά από γύψο και μετά από περιπατητήρα, αποκατάσταση τραυματισμού αστραγάλου ή/και μετεγχειρητική χρήση.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό με το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες αρχές.

2. Left og træk den øverste del af luftbårepuderne tilbage for at finde ventilerne.
a. Pump luft-lineren op for at give yderligere kompression og stabilitet. Sæt medfølgende luftrør ind i luftventilen, og pump op. Pump ikke for hårdt op.
b. For at lukke luft ud skal du sætte rør i luftventilen og klemme forsigtigt sammen, indtil den ønskede størrelse er opnået.
c. Luk ventilen igen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Håndvaskes med et mildt rengøringsmiddel i koldt vand. Må ikke maskinvaskes eller tørretumbler. Må ikke afbleges.

BORTSKAFFELSE
Enheden og emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Ossur påtager sig intet ansvar, hvis enheden ikke vedligeholdes som anvist, hvis enheden er samlet med komponenter fra andre producenter, eller hvis enheden anvendes uden for de anbefalede brugsbetingelser, -anvendelse eller -miljø.

2. Ved kuldebehandling nedkøles gelpuden først i en fryser (20–60 min).
3. Ved varmebehandling opvarmes gelpuden i varmt vand eller i en mikrobølgeovn (5-sekunders intervaller ved laveste indstilling), indtil den er varm, men ikke for varm til at holde i hånden.
4. Sæt gelpuden tilbage i enheden, og fastgør den.

Kun gel-version
FORSIGTIG: Direkte hudkontakt med opvarmet eller nedkølet gelpude kan give forbrændinger eller forfrysninger. Brug en bomuldsstrømpe under enheden.
BEMÆRK: Overophedning af gelpuden kan resultere i forbrændinger eller skade på gelpuden.
1. Fjern gelpuden fra enheden, og inspicér den. Undlad at bruge den, hvis den er beskadiget.

Endast luftversionen
1. Om obehag kvarstår efter ompositionering av ortosen och/eller justering av remmarna, försök justera volymen på luftfinnen.
2. Dra ned den övre delen av blåsans kuddar för att hitta luftventilen.
a. Blås upp luftlinern för ytterligare kompression och stöd. För in det medföljande blåsröret i luftventilen och blås upp. Blås inte upp för mycket.
b. Om luft behöver släppas ut, för in rör placeras i luftventilen och klämmas försiktigt tills önskad volym nåtts.
3. Vik tillbaka ventilen.

Endast gelversionen
VARNING: Direkt hudkontakt med uppvärmd eller nedkyld gelkudde kan medföra brännskador eller frostskador. Använd en bomullssocka inuti enheten.
OBSERVERA: Överhettning av gelkudden kan medföra brännskador eller skador på gelkudden.
1. Ta bort gelkudden från enheten och undersök den. Använd inte om den är skadad.
2. För kylbehandling ska gelkudden kylas i en frys (20–60 min).
3. För värmebehandling ska gelkudden värmas i varmt vatten eller en mikrovågsugn (femsekundersintervall på lägsta instrållningen) tills den är varm, men inte för varm för att hålla i.
4. Sätt tillbaka gelkudden i enheten och sätt fast den.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Handtvätta med mild tvål i kallt vatten. Använd inte tumlare eller torktumlare. Använd inte blekmedel.

KASSERING
Enheten och förpackningen måste kasseras enligt lokala föreskrifter.

ANSVAR
Ossur påtar sig inget ansvar om enheten inte underhålls enligt instruktionerna, om den monteras med komponenter från andra tillverkare eller om den används på ett sätt, i ett skick, i en miljö eller i en miljö som inte rekommenderas.

SUOMI

MD Lääkinnällinen laite

KÄYTTÖAIHEET
Tilanteet, joissa tarvitaan inversion/eversion rajoitusta. Näitä voivat olla lievät tai vaikeat nilkan nyrjähdykset, krooninen nilkan epävakaus, kipsin ja walker-tuen käytön jälkeinen tuki ja/tai leikkauksenjälkeinen käyttö.

YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja asianomaisille viranomaisille.
HUOMIO: Älä koskaan pidä laitetta avohaavan päällä.
VAROITUS: Älä kiristä laitetta liikaa. Tämä voi heikentää veren kiertoa (iho voi muuttua siniseksi, valkoiseksi tai kylmäksi). Potilaiden, joiden verenkierto on heikentynyt (esim. diabeteksen vuoksi) on keskusteltava terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen käyttöä.
VAROITUS: Jos laitteessa ilmenee merkkejä sen normaalia toimintaa häiritsevästä vaurioista tai kulumisesta, potilaan on lopetettava laitteen käyttö ja otettava yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

PUKEMISOHJEET
Potilaan on aina pidettävä puuvillasukkaa tuen alla.
1. Levitä mansetit ja pane kantapää kantapäähihnan päälle tarkistaaksesi sopivuuden.
2. Kantahihnan tulisi istua tiukasti jalan alla ja olla tasaisesti molemmilla puolilla, ja sivutukien alareunan tulisi olla hieman jalkapohjan yläpuolella.

3. Kylmähoitoa varten viilennä geelityyny pakastimessa (20–60 min).
3. Kuumahoitoa varten lämmitä geelityynyä lämpimässä vedessä tai mikroaaltouunissa (5 sekunnin jaksoissa pienimmällä teholla), kunnes tyyny on lämmin mutta ei liian kuuma pideltäväksi kädessä.
4. Laita geelityyny takaisin laitteeseen ja kiinnitä se.

PUHDISTUS JA HOITO
Pese käsin miedolla puhdistusaineella ja kylmällä vedellä. Älä käytä pesukoneita tai kuivausrumpua. Älä käytä puhdistukseen valkaisuainetta.

NEDERLANDS

MD Medisch apparaat

GEBRUIKSAANWIJZING
Omstandigheden die een beperking van inversie/eversie vereisen. Bijvoorbeeld bij lichte tot ernstige verstuikingen, chronische instabiliteit van de enkel, ondersteuning na gipsverband of na gebruik van een walker, revalidatie na enkelletsel en/of postoperatief gebruik.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Elk ernstige incident met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de relevante autoriteiten.
LET OP: Draag het hulpmiddel nooit rechtstreeks over een open wond.
WAARSCHUWING: Maak het hulpmiddel niet te strak vast. Dit kan de bloedstroom verminderen (de huid kan blauw, wit of koud worden). Patiënten met een verminderde bloedcirculatie (bijv. door diabetes) moeten vóór gebruik een professionele zorgverlener raadplegen.
WAARSCHUWING: als het hulpmiddel tekenen vertoont van schade of slijtage die de normale werking belemmeren, moet de patiënt stoppen met het gebruik van het hulpmiddel en contact opnemen met een professionele zorgverlener.

AANLEGGEN
De patiënt moet altijd een katoenen sok onder de brace dragen.
1. Vouw de schalen open en plaats de hiel op de hielband om de passvorm te controleren.
2. De hielband moet goed passen onder de voet, aan beide kanten gelijk zijn en de onderkant van de verstevigingen moeten zich iets boven de onderkant van de voet bevinden.
3. Pas indien nodig de hielbreedte aan door het onderste deel van de liner op te tillen en de klittenband te verstellen. Er kunnen verdere aanpassingen van de hielband nodig zijn als de zwelling van de enkel verandert.
4. Houd de verstevigingen tegen het been terwijl u de onderste band strak om de brace wikkelt.
5. Wikkel de bovenste band eromheen. Verstel de banden zo nodig voor een stevige en comfortabele pasvorm.

Alleen luchtversie
1. Als het ongemak aanhoudt na repositionering van de brace en/of het opnieuw afstellen van de banden, probeer

PORTUGUÊS

MD Dispositivo médico

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Situações que requeiram restrição de inversão/eversão. Estas podem incluir entorses do tornozelo ligeiras a graves, instabilidade crónica do tornozelo, suporte pós-gesso e pós-andarilho, reabilitação de lesão no tornozelo e/ou utilização pós-cirúrgica.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
Qualquer incidente grave com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e às autoridades competentes.

2. Ved at lukke forsiden af, kan du se, om hælen er placeret korrekt i hælstroppen.
3. Hælstroppen skal være stram under foden, og den skal være ens på begge sider. Hælstroppen skal være placeret, så den ikke er for høj eller for lav.
4. Hvis du har brug for det, kan du justere hælstroppen ved at løfte den nederste del af liner'en og justere velcrobåndet. Du kan muligvis få brug for yderligere justeringer, hvis ankelhævelsen ændrer sig.
5. Hold stigbøjlerne op mod benet, mens du vikler den nederste strop tæt rundt om skinnen.
6. Vikl den øverste strop omkring. Juster om nødvendigt stropperne igen for at opnå en komfortabel passform.

Kun luftversion
1. Hvis det fortsat føles ubehageligt efter omplacering af ligaturen og/eller justering af stropperne, kan du prøve at justere mængden af luft-liner.

2. Skrell den øverste delen av blæreputene for å finne luftventilen.
a. Blås opp luftforingen for ytterligere kompresjon og støtte. Sett inn det medfølgende luftrøret gjennom luftventilen og blås opp. Ikke blås opp for mye.
b. Fjern luft ved å plassere røret i luftventilen og klemme forsiktig til ønsket volum er oppnådd.
3. Brett ventilen tilbake.

Kun gelversjon
FORSIKTIG: Direkte hudkontakt med oppvarmet eller avkjølt gelpute kan føre til brannskader eller frostskader. Bruk en bomullssokk under enheten.
MERK: Overoppheting av gelputen kan føre til brannskader eller skade på gelputen.
1. Fjern gelputen fra enheten og inspiser den. Ikke bruk hvis den er skadet.
2. For kald terapi avkjøles gelputen i en fryser (20–60 min).
3. For varm terapi varmes gelputen i varmt vann eller i en mikrobølgeovn (5 sekunders intervaller ved laveste innstilling) til den er varm, men ikke for varm til å holde.
4. Sett gelputen tilbake i enheten og fest den.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Vask for hånd i kaldt vann med mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk vaskemaskin eller tørketrommel. Må ikke bleikes.

AVFALLSHÅNDTERING
Enheten og emballasjen må kastes i henhold til lokale forskrifter.

ERSTATNINGSANSVAR
Ossur påtar seg intet ansvar hvis enheten ikke vedlikeholdes som instruert, manipuleres med andre produsenters deler eller brukes utenfor anbefalte tilstander, bruksområder eller miljø.

HÄVITTÄMINEN

Laite ja pakkaus on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

VASTUU
Ossurilla ei ole vastuuta, jos tuotetta ei ole hoidettu käyttöohjeiden mukaisesti, jos tuotteeseen on liitetty muiden valmistajien komponentteja, tai jos tuotetta on käytetty, kun se ei ole suositusten mukaisessa käyttötuloksessa, muilla kuin suositelluilla käyttötarkoituksiin tai muissa kuin suositelluissa ympäristöissä.

PUHDISTUS
Pese käsin miedolla puhdistusaineella ja kylmällä vedellä. Älä käytä pesukoneita tai kuivausrumpua. Älä käytä puhdistukseen valkaisuainetta.

NEDERLANDS

MD Medisch apparaat

GEBRUIKSAANWIJZING
Omstandigheden die een beperking van inversie/eversie vereisen, bijvoorbeeld bij lichte tot ernstige verstuikingen, chronische instabiliteit van de enkel, ondersteuning na gipsverband of na gebruik van een walker, revalidatie na enkelletsel en/of postoperatief gebruik.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Elk ernstige incident met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de relevante autoriteiten.
LET OP: Draag het hulpmiddel nooit rechtstreeks over een open wond.
WAARSCHUWING: Maak het hulpmiddel niet te strak vast. Dit kan de bloedstroom verminderen (de huid kan blauw, wit of koud worden). Patiënten met een verminderde bloedcirculatie (bijv. door diabetes) moeten vóór gebruik een professionele zorgverlener raadplegen.
WAARSCHUWING: als het hulpmiddel tekenen vertoont van schade of slijtage die de normale werking belemmeren, moet de patiënt stoppen met het gebruik van het hulpmiddel en contact opnemen met een professionele zorgverlener.

AANLEGGEN
De patiënt moet altijd een katoenen sok onder de brace dragen.
1. Vouw de schalen open en plaats de hiel op de hielband om de passvorm te controleren.
2. De hielband moet goed passen onder de voet, aan beide kanten gelijk zijn en de onderkant van de verstevigingen moeten zich iets boven de onderkant van de voet bevinden.
3. Pas indien nodig de hielbreedte aan door het onderste deel van de liner op te tillen en de klittenband te verstellen. Er kunnen verdere aanpassingen van de hielband nodig zijn als de zwelling van de enkel verandert.
4. Houd de verstevigingen tegen het been terwijl u de onderste band strak om de brace wikkelt.
5. Wikkel de bovenste band eromheen. Verstel de banden zo nodig voor een stevige en comfortabele pasvorm.

Alleen luchtversie
1. Als het ongemak aanhoudt na repositionering van de brace en/of het opnieuw afstellen van de banden, probeer dan het volume van de luchtkussens aan te passen.
2. Sla het bovenste deel van de luchtkussens om. U ziet dan de luchtklep.
a. Blaas het luchtkussen op voor extra compressie en ondersteuning. Steek het meegeleverde luchtslangetje in de luchtklep en blaas. Blaas het kussen niet te hard op.
b. Om lucht te verwijderen, plaatst u het slangetje in de luchtklep en knijpt u voorzichtig tot het gewenste volume is bereikt.
3. Vouw de klep terug.

Alleen gelversie
LET OP: Direct huidcontact met verwarmde of gekoelde gelpakken kan brandwonden of bevriezing veroorzaken. Gebruik een katoenen sok onder het hulpmiddel.
OPMERKING: Oververhitting van de gelpad kan brandwonden of schade aan de gelpad veroorzaken.
1. Verwijder het gelkussen van het hulpmiddel en inspecteer het. Niet gebruiken indien het beschadigd is.
2. Koel voor een koudebehandeling het gelkussen in een vriezer (20–60 min).
3. Voor warmtebehandeling verwarmt u het gelkussen in warm water of in een magnetron (met intervallen van 5 seconden op de laagste stand) totdat het warm, maar niet te heet is om vast te houden.
4. Plaats het gelkussen terug in het hulpmiddel en maak het vast.

REINIGING EN ONDERHOUD
Op de hand wassen in koud water met een mild reinigingsmiddel. Geen wasmachine of droger gebruiken. Geen bleekmiddel gebruiken.

AFVOEREN
Het hulpmiddel en de verpakking moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke regelgeving.

AANSPRAKELIJKHEID
Ossur aanvaardt geen aansprakelijkheid als het hulpmiddel niet wordt onderhouden zoals aangegeven, als het hulpmiddel in elkaar is gezet met componenten van andere fabrikanten, of als het hulpmiddel wordt gebruikt volgens het aanbevolen gebruik, de aanbevolen toepassing of in de juiste omgeving.

COLOCAÇÃO
O paciente deve usar sempre uma meia de algodão por baixo da tornozeleira.
1. Abra as estruturas e coloque o calcanhar na alça para verificar o ajuste.
2. A alça do calcanhar deve ficar bem ajustada debaixo do pé, de modo igual em ambos os lados, e a base dos estribos deve ficar ligeiramente acima da base do pé.
3. Se necessário, ajuste a largura do calcanhar, levantando a parte inferior do liner, e ajuste o gancho e a aba. Podem ser necessários outros ajustes da alça do calcanhar se o inchaço do tornozelo mudar.
4. Segure os estribos na vertical e junto à perna enquanto enrola a parte inferior confortavelmente à volta da tornozeleira.
5. Aperte a alça superior. Reajuste as alças conforme necessário para um ajuste seguro e confortável.

Apenas versão Air
1. Se o desconforto persistir após o reposicionamento da tornozeleira e/ou reajuste das alças, tente reajustar o volume do revestimento de ar.
2. Remover a parte de cima das almofadas da câmara de ar para localizar a válvula de ar.
a. Insuflar o revestimento de ar para obter compressão e suporte adicionais. Inserir o tubo de ar e insuflar. Não insuflar demasiado.
b. Para remover ar, colocar o tubo na válvula de ar e apertar suavemente até alcançar o volume desejado.
3. Dobrar novamente a válvula.

Apenas versão Gel
CUIDADO: O contacto direto da pele com a almofada de gel aquecida ou arrefecida pode resultar em queimaduras. Utilizar uma meia de algodão por baixo do dispositivo.
AVISO: O sobreaquecimento da almofada de gel pode resultar em queimaduras ou danos na almofada de gel.
1. Retirar a almofada de gel do dispositivo e inspecionar. Não utilizar se estiver danificada.
2. Para a terapia a frio, arrefecer a almofada de gel num congelador (20-60 min).
3. Para a terapia a quente, aquecer o gel em água quente ou num micro-ondas (intervalos de 5 segundos com a regulação mais baixa) até que esteja quente, mas não demasiado quente para segurar.
4. Voltar a colocar a almofada de gel no dispositivo e fixar.

CUIDADOS E LIMPEZA
Lavar à mão em água fria, utilizando um detergente suave. Não utilizar máquina de lavar ou de secar. Não utilizar lixívia.

ELIMINAÇÃO
O dispositivo e a embalagem têm de ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.

RESPONSABILIDADE
A Ossur não assume responsabilidade se o dispositivo não for mantido como indicado pelas instruções, se o dispositivo for montado com componentes de outros fabricantes ou se o dispositivo for utilizado fora das condições recomendadas de utilização, aplicação, ou ambiente.

POLSKI

MD Wyrób medyczny

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Sytuacje wymagające ograniczenia pronacji/supinacji. Obejmują między innymi skrę

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ossur nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wyrób nie jest konserwowany zgodnie z instrukcją, zostat zmontowany z elementów innych producentów lub jest używany niezgodnie z zaleceniami warunkami użytkowania, zastosowaniem dek nazilge szkin. w nieprawidłowym środowisku.

ČESKÝ

MD Zdravotnický prostředek

INDIKACE K POUŽITÍ

Situace vyžadující omezení invere/everze. Např. mírné až závažné výrony kotníku, chronická nestabilita hlezna, propadlá klenba po sejmutísdržené fixaci či fixační ortézy, rehabilitace po zlomu kotníku a/nebo pooperační použití.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Veškeré zvažované nežádoucí příhody, ke kterým dojde v souvislosti s tímto zařízením, ohlaste výrobci a příslušným orgánům.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nevnucujte zařízení přímo na otevřené rány.

VAROVÁNÍ: Neutahujte zařízení příliš silně. Mohlo by dojít k omezení toku krve (to se projevuje zmodráním, zblednutím kůže nebo studenou končetinou), Pacienti s poruchami krevního oběhu (např. diabetici) se před použitím musí poradit se zdravotnickým pracovníkem.

VAROVÁNÍ: Pokud prostředek vykazuje známky poškození nebo opotřebení, které brání jeho správné funkci, musí jej pacient přestat používat a kontaktovat zdravotnického pracovníka.

ZKOUŠKA

1. Pacient by měl pod ortézou vždy nosit ponožku nebo punčochu.
2. Roztáhněte skořepiny a položte patu na popruh paty, abyste zkontrolovali správný tvar.
3. Popruh paty musí pod chodidlem těsně přiléhat a musí být na obou stranách vyrovnaný. Spodní část třmínku musí být mírně nad spodní částí chodidla.
4. V případě potřeby nastavte šířku paty zvednutím spodní části návleku a upravte použitím sešívacího zipu. Pokud dochází ke změnám obvodu kotníku, může být zapotřebí další úprava popruhů paty.
5. Určete třmínky nahoře proti noze a omotejte spodní popruh těsně kolem ortézy.
6. Omotejte horní popruh. V případě potřeby popruhy znovu upravte tak, aby seděly pevně a pohodlně.

Pouze verze se vzduchovými vystelkami

1. Pokud nepohodlí přetrvává i po nastavení ortézy anebo upravení popruhů, zkuste znovu upravit obojen vzduchové vystelky.

TÜRKÇE

MD Medikal Ürün

KULLANIM ENDİKASYONLARI

İnversiyon/everziyon kısıtlaması gerektiren durumlar. Burkular, hafif ila şiddetli ayak bileği burkulmaları, kronik ayak bileği instabilitesi; alçı sonrası ve yürütec sonrası destek, ayak bileği yaralanması rehabilitasyonu ve/veya ameliyat sonrası kullanımı içerebilir.

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

Ürünlele ilgili herhangi bir ciddi olumsuz olay, üreticiye ve ilgili yetkili makama bildirilmelidir.

DİKKAT: Ürünü asla açık bir yaranın üzerine giymeyin.

UYARI: Ürünü fazla sıkmayın. Bu, kan akışının azalmasına neden olabilir (cilt renginde veya beyaza dönebilir ya da soğuyabilir). Kan dolaşımında azalma olan hastalar (ör. diyabet nedeniyle), kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmalıdır.

UYARI: Üründe, normal işlevini engelleyen hasar veya yıpranma belirtileri varsa hasta Ürünü kullanmayı bırakmalı ve bir sağlık uzmanıyla görüşmelidir.

TAKMA İŞLEMİ

Hasta otezin altına her zaman pamuklu çorap giymelidir.

1. Ostdrathe horní část pelot vaku a vyhledejte vzduchový ventil.
   a. Přifoukněte vzduchovou vystelku, abyste dosáhli lepší komprese a podpory. Protlačte vzduchovým ventilem dodanou vzduchovou trubičku a přifoukněte vystelku. Nepřehušťujte.
   b. Chcete-li vzduch odstranit, vložte trubičku do vzduchového ventilu a jemně stiskněte, dokud nedosáhnete požadovaného objemu.
3. Vratte ventil do původní polohy.

Pouze verze s gelovou pelotou

UPOZORNĚNÍ: Přímý kontakt pokožky s vyhřívanou nebo chlazenou gelovou pelotou může způsobit popáleniny nebo omrzliny. Pod zařízením noste bavlněnou ponožku.

UPOZORNĚNÍ: Přehřátí gelové pelety může způsobit popáleniny nebo pelotu poškodit.

1. Vyjměte gelovou pelotu ze zařízení a zkontrolujte ji. Nepoužívejte ji, pokud je poškozená.
2. Pro chladovou terapii ochlaďte gelovou pelotu v mrazicím boxu (20–60 min).
3. Pro tělcbu teplem zahřejte gelovou pelotu v teplé vodě nebo v mikrovlnné troubě (Sseikundvě intervaly při ohřevu podle nastavení), dokud nebude teplá, ale ne příliš horká na držení v ruce.
4. Vložte gelovou pelotu zpět do zařízení a upevněte ji.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Umyježe ručně jemným čisticím prostředkem ve studené vodě. Nepertre v práce ani metodě v sušičce. Nepoužívejte bělicí prostředky.

LIKVIDACE

Zařízení a obal je nutné likvidovat v souladu s místními nařízeními.

ODPOVĚDNOST

Společnost Ossur nepřebírá odpovědnost za zařízení, které nebylo udržováno v souladu s instrukcemi, za zařízení, které bylo sestaveno z použitím komponent od jiných výrobců, ani za zařízení, které bylo používáno jinak než za doporučených podmínek, pro jiné než doporučené aplikace či v jiném než doporučeném prostředí.

Pouze verze se vzduchovými vystelkami

1. Pokud nepohodlí přetrvává i po nastavení ortézy anebo upravení popruhů, zkuste znovu upravit obojen vzduchové vystelky.

РУССКИЙ

MD Медицинское устройство

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ситуации с ограничением ротации голеностопного сустава. Они могут включать в себя растяжения связок голеностопа от умеренных до тяжелых, хроническую нестабильность голеностопного сустава, подержку после наложения шин и использования ходунков, реабилитацию после травм голеностопного сустава и/или послеоперационное использование.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Не затягивайте изделие слишком сильно. Это может уменьшить кровоток (кожа может стать синюшной, бледной или холодной).

Пациенты со сниженным кровообращением (например, из-за диабета) должны проконсультироваться с врачом перед использованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если наблюдаются признаки повреждения или износа устройства, мешающие его нормальному функционированию, пациент должен немедленно прекратить использование устройства и обратиться к медицинскому работнику.

УСТАНОВКА

Пациент всегда должен носить хлопковый носок перед бандаж.

1. Расправьте оболочки и поместите пятку на пяточный ремень, чтобы проверить посадку.
2. Пяточный ремень должен плотно прилегать под пяткой, быть одинаковым с обеих сторон, а низ скоб должен находиться чуть выше основания стопы.
3. При необходимости отрегулируйте ширину пятки, приподняв нижнюю часть чехла и отрегулировав язычок с липучкой. При изменении отека голеностопа может потребоваться дополнительная регулировка пяточного ремня.
4. Примкните оргезы в ноге, плотно обернув нижний ремень вокруг бедра.
5. Оберните верхний ремень. При необходимости отрегулируйте ремни для надежной и удобной посадки.

日本語

MD 医療機器

使用適応

足関節の内反や外反の制限を必要とする状態。

1. Havayı gidermek için tüpü hava kapağının içine yerleştirin ve istenen konfor seviyesine gelene dek nazikçe sıkın.
3. Kapağı geri katlayın.

Sadece Jel versiyonu

DİKKAT: Isıtılmış veya soğutulmuş jel pedi ile doğrudan deri teması, yanıklara veya soğuk yanmasına neden olabilir. Ürünün altında pamuklu çorap kullanın.

NOT: Jel pedi ısıtılırken veya soğutulurken yanıklara veya jel pedin hasar görmesine neden olabilir.

1. Jel pedi Üründen çıkarın ve inceleyin. Hasar görmüşse kullanmayın.
2. Soğuk terapi için jel pedi dondurucuda (20-60 dakika) soğutun.
3. Sıcak tedavi için jel pedi ılık suda veya mikrodalga fırında (en düşük ayarda 5 saniye aralıklarla) tutulamayacak kadar sıcak olmaması koşuluyla ılık olana kadar ısıtın.

SORUMLULUK

Ossur, ürünün talimatlara uygun olarak bakımının yapılmadığı, diğer üreticilerin ürünlerine ait aksamlarla monte edildiği veya önerilen kullanım koşulunun, uygulamanın veya ortamın dışında kullanıldığı durumlarda sorumluluk kabul etmez.

Gel uygulaması

1. Gel pedi Ürün geri takın ve sabitleyin.

TEMİZLİK VE BAKIM

Soğuk suda sıvı deterjanla elde yıkayın. Çamaşır makinesi veya kurutma makinesi kullanmayın. Çamaşır suyu kullanmayın.

İMHA

Ürün ve ambalaj, yerel düzenlemelere göre imha edilmelidir.

SORUMLULUK

Ossur, ürünün talimatlara uygun olarak bakımının yapılmadığı, diğer üreticilerin ürünlerine ait aksamlarla monte edildiği veya önerilen kullanım koşulunun, uygulamanın veya ortamın dışında kullanıldığı durumlarda sorumluluk kabul etmez.

ŞİŞİRME

1. Hava valfini yerini bulmak için kese pedlerinin üst kısmını soyun.
2. İlave kompresyon ve destek için hava astarı şişirin. Sağlanan tüpü hava valfinin içinden geçirin ve şişirin. Fazla şişirmeyin.

安全に関する注意事項

デバイスによる重大な事故は、製造者および関係当局に報告する必要があります。

注意：傷口に直接デバイスを着用しないでください。

警告：デバイスを締めすぎないようにしてください。血流の低下を引き起こす可能性があります（皮膚が青白くなったり冷たくなる）。血流障害のある患者（糖尿病など）は、使用前に医療専門家に相談してください。

警告：デバイスに損傷や摩耗の兆候が見られ、通常の機能が妨げられている場合、患者はデバイスの使用を中止し、医療専門家に連絡する必要があります。

装着

患者はまず装具の下に綿の靴下を着用してください。

1. シェルを広げ、適合を調べるために、踵をヒールストラップの上に配置してください。
2. ヒールストラップが足の下にぴったりと装着され、踵の奥まで、ストラップの端が足の底より少し上にある必要があります。
3. 必要に応じて、ライナーの下部を持ち上げてヒールストラップ、およびアンナータブを調整してください。足関節の腹4の状態が変化した場合は、ヒールストラップを交換する調整することが必要になる可能性があります。
4. 下部ストラップを装具の周りにぴったりと巻き付けながら、スターアップを振に密着させてください。
5. トップストラップを巻き付けてください。安全で快適な装着感を得るために、必要に応じてストラップを再調整してください。

Air バージョンのみ

1. 装具を再配置したりしても不快感が続く場合は、エアライナーの容量を再調整してください。
2. エアバルブの位置を確認するために、空気抜バルブの上部をはがしてください。

中文

MD 医疗器械

预期用途

用于对入体踝部的外固定或支撑

使用说明

可用于限制踝关节内翻/外翻的情况。这些情况可包括轻度至重度踝关节扭伤、慢性踝关节不稳定、石膏固定后及步行援使用后的支撑、踝关节损伤康复和/或手术后使用。

一般安全说明

必须向制造商和有关当局报告与本器械有关的任何严重事件。

注意：请勿将本器械直接穿戴在裸露的伤口上。

警告：不宜过度束紧。 过紧可能会影响血液循环（皮肤会变青白、变冷）。 血液循环减少（例如糖尿病）的患者在使用前应咨询保健专业人员。

警告：如果本器械出现材料或者损部的途象而影响其正常功能，患者应停用本器械并与专业医护人员联系。

佩戴

患者应始终佩戴保健套支具前穿上棉质袜子。

1. 打开外壳，然后将足跟放在足跟绑带上，以检查是否贴合。
2. 足跟绑带应紧贴足底，两侧等长，踝部略高于足底。
3. 如果需要，通过提起衬垫的下部并调整钩环和片来调整足跟支撑度，如果脚踝肿胀和/或发生变化，可能需要进一步调整足跟绑带。
4. 将内外侧支撑件紧靠踝部，同时确保绕收紧绑带时衬垫正确。
5. 收紧最上方绑带。 如有需要，重新调整绑带，以确保佩戴牢固状态。

安全注意事项

デバイスによる重大な事故は、製造者および関係当局に報告する必要があります。

注意：傷口に直接デバイスを着用しないでください。

警告：デバイスを締めすぎないようにしてください。血流の低下を引き起こす可能性があります（皮膚が青白くなったり冷たくなる）。血流障害のある患者（糖尿病など）は、使用前に医療専門家に相談してください。

警告：デバイスに損傷や摩耗の兆候が見られ、通常の機能が妨げられている場合、患者はデバイスの使用を中止し、医療専門家に連絡する必要があります。

装着

患者はまず装具の下に綿の靴下を着用してください。

1. シェルを広げ、適合を調べるために、踵をヒールストラップの上に配置してください。
2. ヒールストラップが足の下にぴったりと装着され、踵の奥まで、ストラップの端が足の底より少し上にある必要があります。
3. 必要に応じて、ライナーの下部を持ち上げてヒールストラップ、およびアンナータブを調整してください。足関節の腹4の状態が変化した場合は、ヒールストラップを交換する調整することが必要になる可能性があります。
4. 下部ストラップを装具の周りにぴったりと巻き付けながら、スターアップを振に密着させてください。
5. トップストラップを巻き付けてください。安全で快適な装着感を得るために、必要に応じてストラップを再調整してください。

Air バージョンのみ

1. 装具を再配置したりしても不快感が続く場合は、エアライナーの容量を再調整してください。
2. エアバルブの位置を確認するために、空気抜バルブの上部をはがしてください。

中文

MD 医疗器械

预期用途

用于对入体踝部的外固定或支撑

使用说明

可用于限制踝关节内翻/外翻的情况。这些情况可包括轻度至重度踝关节扭伤、慢性踝关节不稳定、石膏固定后及步行援使用后的支撑、踝关节损伤康复和/或手术后使用。

一般安全说明

必须向制造商和有关当局报告与本器械有关的任何严重事件。

注意：请勿将本器械直接穿戴在裸露的伤口上。

警告：不宜过度束紧。 过紧可能会影响血液循环（皮肤会变青白、变冷）。 血液循环减少（例如糖尿病）的患者在使用前应咨询保健专业人员。

警告：如果本器械出现材料或者损部的途象而影响其正常功能，患者应停用本器械并与专业医护人员联系。

佩戴

患者应始终佩戴保健套支具前穿上棉质袜子。

1. 打开外壳，然后将足跟放在足跟绑带上，以检查是否贴合。
2. 足跟绑带应紧贴足底，两侧等长，踝部略高于足底。
3. 如果需要，通过提起衬垫的下部并调整钩环和片来调整足跟支撑度，如果脚踝肿胀和/或发生变化，可能需要进一步调整足跟绑带。
4. 将内外侧支撑件紧靠踝部，同时确保绕收紧绑带时衬垫正确。
5. 收紧最上方绑带。 如有需要，重新调整绑带，以确保佩戴牢固状态。

责任

如果未按照说明对器械进行维护，或者将器械与其他制造商的零部件组装在一起，或者在推荐的使用条件、应用条件或环境之外使用器械，Ossur均不承担责任。

代理人和生产厂家信息

备案人/生产企业：Ossur hf. 奥索股份有限公司

备案人/生产企业地址：Grjothals 1–5 Reykjavik 110 Iceland

备案人/生产企业联系方式：+354 5151300

한국일

MD 의료 기기

적응증

내/외번 제한이 필요한 상황. 여기에는 경미한 단계부터 중증 단계의 발목 염좌, 만성 발목 불안정성, 깁스 후 및 보행 후 지지, 발목 부상 재활 및/또는 수술 이후 사용이 포함될 수 있습니다.

일반 안전 지침

장치와 관련된 모든 심각한 사고는 제조업체 및 관련 당국에 보고해야 합니다.

주의: 장치가 없는 부위에 제품을 착용하지 않습니다.

경고: 제품을 너무 세게 조이지 마십시오. 이는 혈류량을 낮추고 감각이나(피부가 창백하거나 차갑게 됨) 차가워질 수 있습니다. 혈액 순환이 저하된 환자(예: 당뇨병)는 사용하기 전에 의료 전문가와 상담해야 합니다.

주의: 장치 손상의 징후가 보이거나 장치의 기능을 방해하는 마모가 발생하면 환자는 장치 사용을 중단하고 의료 전문가에게 문의해야 합니다.

착용

환자는 항상 보조기 아래에 면 양말을 착용해야 합니다.

1. 셸을 펼치고 뒤꿈치를 힐 스트랩에 올려 핏 맞는지 확인합니다.
2. 힐 스트랩은 발 아래에 꼭 맞아야 하고 양쪽이 동일해야 하며 스티럽 위쪽에 발바닥보다 약간 위에 있어야 합니다.
3. 필요시 라이너의 하단 부분을 들어 올려 힐 스트랩과 앤클 후 조정 및 부프 텔을 조정합니다. 부종이 부은 경우, 힐 스트랩에 대한 추가 조정이 필요할 수 있습니다.
4. 보조기 주위에 하단 스트랩을 단단히 감싸면서 스티럽 스트랩을 고정시킵니다.
5. 상단 스트랩을 감습니다. 안전하고 편안한 착용감을 위해 필요시 스트랩을 재조정합니다.

에어 버전만 해당

1. 보조기를 올바르게 착용하거나 조정한 후에도 불편함이 지속되면 에어 라이너의 볼륨을 재조정하십시오.

SLOVENČina

MD Zdravotnícka pomôcka

INDIKÁCIE NA POUŽITIE

Situácie vyžadujúce obmedzenie inverzie/everzie. Medzi ne môže patriť ľahké až ťažké zvädnutie vnútorného členka, chronická nestabilita členka, podpora po odstránení sadrovej dlahy a po používaní chodúlky, rehabilitácia po zranení členka a/alebo pooperačné použitie.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Všetky závažné udalosti súvisiace s touto pomôckou je nutné hlásiť výrobcovi a príslušným orgánom.

UPOZORNENIE: Pomôcku nikdy nenoste na otvorenej rane.

VAROVANIE: Pomôcku príliš neutiahujte. Môže to znížiť prietok krvi (pokožka môže zmodrieť, zbeliet alebo môže zostať studená).

1. Pacienti so zníženým krvným obehom (napr. s cukrovkou) by sa pred použitím mali poradiť so zdravotníckym pracovníkom.

VAROVANIE: Ak pomôcka vykazuje známky poškodenia alebo opotrebovania, ktoré bránia normálnej funkcii, pacient ju musí prestať používať a kontaktovať zdravotníckeho pracovníka.

NASADENIE

Pacient by mal pod ortézou nosiť vždy bavlnenú ponožku.

1. Roztiahnite kryt a položte patu na patovú popruh, aby ste skontrolovali, či sedí.
2. Pätový popruh by mal tesne priliehať k chodidlu, na oboch stranách by mal vyčnievať rovnako a spodok strmeňov by mal byť mierne nad spodnou časťou chodidla.

代理人及售后服务机构：奥索假肢矫形康复器材（上海）有限公司

代理人及售后服务机构地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号 8 区 201 室

代理人及售后服务机构联系方式：021-6127 1727

生产日期：见外包装

使用期限：产品启用后 6 个月

生产地址：见外包装

医疗器械备案凭证编号 / 技术要求编号：沪械备 20172072

说明书版本号：3

备案人 / 生产企业联系方式：+354 5151300

한국일

MD 의료 기기

적응증

내/외번 제한이 필요한 상황. 여기에는 경미한 단계부터 중증 단계의 발목 염좌, 만성 발목 불안정성, 깁스 후 및 보행 후 지지, 발목 부상 재활 및/또는 수술 이후 사용이 포함될 수 있습니다.

일반 안전 지침

장치와 관련된 모든 심각한 사고는 제조업체 및 관련 당국에 보고해야 합니다.

주의: 장치가 없는 부위에 제품을 착용하지 않습니다.

경고: 제품을 너무 세게 조이지 마십시오. 이는 혈류량을 낮추고 감각이나(피부가 창백하거나 차갑게 됨) 차가워질 수 있습니다. 혈액 순환이 저하된 환자(예: 당뇨병)는 사용하기 전에 의료 전문가와 상담해야 합니다.

주의: 장치 손상의 징후가 보이거나 장치의 기능을 방해하는 마모가 발생하면 환자는 장치 사용을 중단하고 의료 전문가에게 문의해야 합니다.

착용

환자는 항상 보조기 아래에 면 양말을 착용해야 합니다.

1. 셸을 펼치고 뒤꿈치를 힐 스트랩에 올려 핏 맞는지 확인합니다.
2. 힐 스트랩은 발 아래에 꼭 맞아야 하고 양쪽이 동일해야 하며 스티럽 위쪽에 발바닥보다 약간 위에 있어야 합니다.
3. 필요시 라이너의 하단 부분을 들어 올려 힐 스트랩과 앤클 후 조정 및 부프 텔을 조정합니다. 부종이 부은 경우, 힐 스트랩에 대한 추가 조정이 필요할 수 있습니다.
4. 보조기 주위에 하단 스트랩을 단단히 감싸면서 스티럽 스트랩을 고정시킵니다.
5. 상단 스트랩을 감습니다. 안전하고 편안한 착용감을 위해 필요시 스트랩을 재조정합니다.

에어 버전만 해당

1. 보조기를 올바르게 착용하거나 조정한 후에도 불편함이 지속되면 에어 라이너의 볼륨을 재조정하십시오.

청소 및 관리

차가운 물에 중성 세제를 이용하여 손세탁하십시오. 세탁기나 건조기를 사용하지 마십시오. 표백하지 마십시오.

폐기

장치와 포장은 현지 규정에 따라 폐기해야 합니다.

배상 책임

Ossur는 제품을 지침에 따라 유지 관리하지 않은 경우, 타든 제조업체의 구성 요소와 조립한 경우 또는 권장 사용 조건, 적용 분야, 환경을 벗어나 사용된 경우에는 책임을 지지 않습니다.

ROMÂNĂ

MD Dispozitiv medical

INDICAȚII DE UTILIZARE

Situații în care este necesară restricționarea inversiunii/eversiunii. Acestea pot include entorse ale gleznei ușoare până la severe, instabilitate cronică a gleznei, sustinere în urma bandajului cu gips și a ozmei ortopedice, reabilitare a leziunilor gleznei și/ sau utilizare post-chirurgicală.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Orice incident grav petrecut în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorităților competente.

ATENȚIE: Nu purtați dispozitivul direct peste o rană deschisă.

AVERTISMENT: Nu strângeți excesiv dispozitivul. Aceasta poate reduce fluxul sanguin (pielea poate deveni albastră, albă sau rece). Pacienții cu circulație redusă (de ex. cu diabet) trebuie să consulte un cadru medical calificat înainte de utilizare.

AVERTISMENT: Dacă dispozitivul prezintă semne de deteriorare sau uzură care îi afectează funcționarea normală, pacientul trebuie să oprească utilizarea dispozitivului și să contacteze un cadru medical calificat.

MONTAREA

Pacientul trebuie să poarte întotdeauna șosete de bumbac pe sub orteză.

1. Răsfăndiți carcasele și amplasați călcâiul în cuvaua dedicată pentru a verifica potrivirea.
2. Cureaua de călcâi trebuie să se potrivească bine sub picior, să fie egală pe ambele părți, iar partea inferioară a atelelor trebuie să se situeze puțin mai sus de partea inferioară a piciorului.
3. Dacă este necesar, reglați lățimea destinată călcâiului ridicând partea inferioară a manșonului și, după caz, a secțiunea cu scai. Dacă gradul de umflare al gleznei se modifică, pot fi necesare ajustări suplimentare ale curelei de călcâi.
4. Treți atelele pe picior în timp ce înfășurați bine cureaua inferioară în jurul ortezei.
5. Înfășurați cureaua superioară. Reglați din nou curelele după cum este necesar, pentru o potrivire sigură și confortabilă.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Spălați de mână cu detergent neagresiv în apă rece. Nu spălați la mașină și nu folosiți uscătorul. Nu folosiți înălbitori.

ELIMINARE

Dispozitivul și ambalajul trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

RĂSPUNDERE

Ossur își declină responsabilitatea în cazul în care dispozitivul nu este întreținut conform instrucțiunilor de utilizare, dacă dispozitivul este asamblat cu componente de la alți producători sau dacă dispozitivul este utilizat în alte condiții, pentru alte aplicații sau în alte medii decât cele recomandate.

БЪЛГАРСКИ

MD Медицинско изделие

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Ситуации, изискващи ограничаване на инверсията/еверсията. Те могат да включват леки до тежки изкълчвания на глезена, хронична нестабилност на глезена, поддръжка след отстраняване и след процедурна, рехабилитация на глезена и/ или следоперативна употреба.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Всеки сериозен инцидент с изделието трябва да бъде съобщен на производителя и съответните органи.

ВНИМАНИЕ: Никога не носете изделието върху отворена рана.

ВНИМАНИЕ: Не затягайте прекалено силно изделието. Това може да намали притока на кръв (кожата може да посинее, побледнее или изтине). Пациентите с намалено кръвообращение (например поради диабет) трябва да се консултират със здравен специалист преди употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако изделието показва признаци на повреди или износване, затрудняващи нормалната функция, пациентът трябва да спре употребата на изделието и да се свърже със здравен специалист.

ПОСТАВРНЕ

Пациентът винаги трябва да носи памучен чорап под ортезата.

1. Разстелете корите и поставете петата върху каишката за пета, за да проверите дали пасва.
2. Каишката за пета трябва да приляга плътно под крака, да е равна от двете страни, а долната част на стремената да е малко над долната част на стъпалото.
3. Ако е необходимо, регулирайте ширината на петата, като повдигнете долната част на лайнера и регулирате самозалепващите се каишки. Може да се наложи допълнителна регулировка на каишката за пета, ако се промени подуването на глезена.
4. Дръжте стабилизаторa до крака, докато увиете долната каишка плътно около бримка.
5. Увийте горната каишка. Регулирайте повторно каишките, ако е необходимо, за сигурно и удобно поставяне.

Само за въздушна версия

1. Ако дискомфортът продължава след преместване на бримка и/или повторно регулиране на каишките, опитайте да регулирате обема на въздушните възглавници.
2. Отнемете гоpната част на подложките, за да намерите въздушния клапан.
   a. Надуйте въздушния лайнер за допълнителна компресия и опора. Пъстрете въздушната въздушна тръба през въздушния клапан и надуйте. Не надувайте прекомерно.
   b. За да отстраните въздуха, поставете тръбата във въздушния клапан и леко я стиснете, докато се постигне желаният обем.
3. Сгънете клапана назад.
4. Поставете гел подложката обратно в изделието и я затегнете.

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ

Изперете на ръка с мек почистващ препарат в студена вода. Не използвайте перилня или сушилня. Да не се избелва.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изделието и опаковката трябва да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби.

ОТГОВОРНОСТ

Ossur не поема отговорност, ако изделието не се поддържа според инструкциите за употреба, ако то е сглобено с компоненти от други производители или ако се използва в разрез с предписчителната употреба, приложение и среда.

Само за зел версия

ВНИМАНИЕ: Директният контакт на кожата с нагрята или охладена гел подложка може да доведе до изгаряния или замръзване. Използвайте памучен чорап под изделието.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прегряването на гелната подложка може да доведе до изгаряния или повреда на гел подложката.

1. Извадете гел подложката от изделието и я огледайте. Не използвайте, ако е повредена.
2. За студена терапия охладете гел подложката във фризер (20-60 минути).
3. За топлина терапия загрейте гел подложката в топла вода или в микровълнова фурна (на интервали от 5 секунди при най-ниската настройка), докато се затопли, но не е прекалено гореща, за да се сложи.

Ossur Americas
27051 Towne Centre Drive
Foothill Ranch, CA 92610, USA
Tel: +1 (949) 382 3883
Tel: +1 800 233 6263
ossurusa@ossur.com

Ossur Nordic
Box 70801
106 07 Kista, Sweden
Tel: +46 (0)8 5000 0600
ossurnk@ossur.com

Ossur Europe BV
De Schakel 70
5651 GH Eindhoven
The Netherlands
Tel: +800 3539 3668
Tel: +31 499 462840
info-europe@ossur.com

Ossur Deutschland GmbH
Mell-Beese-Str. 11
30829 Köln
Deutschland
Tel: +49 (0) 800 180 8379
info-deutschland@ossur.com

Ossur Canada
21.50 – 6900 Graybar Road
Richmond, BC
V6W 0A5 , Canada
Tel: +1 604 241 8552
assia@ossur.com

Ossur Australia
26 Ross Street,
North Parramatta
NSW 2151 Australia
Tel: +61 2 88382800
officesydney@ossur.com

Ossur Iberia S.L.U
Calle Calendula, 93 -
Miniparc III
Edificio E, Despacho M18
28109 El Soto de la Moraleja,
Alcobendas
Madrid – España
Tel: 900 83 59 68
ossuriberia@ossur.com

Ossur South Africa
Unit 4 & 5
3 on London
Brackenjack Business Park
Brackenfell
7560 Cape Town
South Africa
Tel: +27 0860 888 123
infosa@ossur.com

Ossur APAC
2F, W16 B
No. 1801 Hongmei Road
200233, Shanghai, China
Tel: +86 21 6127 1009
asia@ossur.com

UK DISP
Ossur UK Ltd
Unit No 1, 5 Plark
Hamilton Road
Stockport SK1 2AE, UK
Tel: +44 (0) 8450 060 065
ossuruk@ossur.com

Ossur Iberia S.L.U
Calle Calendula, 93 -
Miniparc III
Edificio E, Despacho M18
28109 El Soto de la Moraleja,
Alcobendas
Madrid – España
Tel: 900 83 59 68
ossuriberia@ossur.com

عربي

MD جهاز طبي

دواعي الاستعمال

الحالات التي تتطلب الحد من الانقلاب/الانقلاب الخارجي. قد تشمل هذه الحالات التواءات خفيفة إلى شديدة في الكاحل، وعدم استقرار مزمن في الكاحل، ودعم ما بعد الجبيرة وما بعد العكاز، و/أو إعادة تأهيل إصابة الكاحل و/ أو الاستخدام بعد الجراحة.

تعليمات السلامة العامة

يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير في الجهاز إلى الشركة المصنعة والجهات المعنية.

تنبيه: تجنب تطبيق هذا الجهاز الطبي على الجروح المفتوحة.

تحذير: لا تقم بربط الجهاز بإحكام شديد. قد يؤدي ذلك إلى تقليل تدفق الدم (يمكن أن يتحول الجلد إلى اللون الأزرق أو الأبيض أو البارد). يجب على المرضى الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية (على سبيل المثال، السكري) استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل الاستخدام.

تحذير: إذا أظهر الجهاز علامات تلف أو بلى تؤثر على وظائفه المعتادة، فيجب على المريض التوقف عن استخدام الجهاز والاتصال بأخصائي الرعاية الصحية.

التركيب

يجب أن يرتدي المريض دائمًا جوربًا قطنيًا تحت الجبيرة.

1. افرد الأصداف وضع الكعب على حامل الكعب للتحقق من ملاءمته.
2. يجب أن يكون حامل الكعب ملائمًا بإحكام أسفل القدم، وأن يكون متساويًا على كلا الجانبين، وجب أن يكون الجزء السفلي من الركاب أعلى قليلاً من أسفل القدم.
3. إذا لزم الأمر، اضبط حامل الكعب عن طريق رفع الجزء السفلي من الغلاف وضبط علامة الخطاف والحلقة. قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات على حامل الكعب إذا تغيرت حالة تورم الكاحل.
4. أحكم الحزام الأمامي بشكل آمن لكنه ليس ضيقًا للغاية. تأكد من أن الركاب مسطحة بشكل مريح مع أسفل القدم.
5. اضبط الحزام العلوي بطريقة آمنة ومريحة.

Само за въздушна версия

1. Ако дискомфортът продължава след преместване на бримка и/или повторно регулиране на каишките, опитайте да регулирате обема на въздушните възглавници.
2. Отнемете горната част на подложките, за да намерите въздушния клапан.
   a. Надуйте въздушния лайнер за допълнителна компресия и опора. Пъстрете въздушната въздушна тръба през въздушния клапан и надуйте. Не надувайте прекомерно.
   b. За да отстраните въздуха, поставете тръбата във въздушния клапан и леко я стиснете, докато се постигне желаният обем.
3. Сгънете клапана назад.

Instructions for Use

FORMFIT® ANKLE STIRRUP
FORMFIT® AIR ANKLE STIRRUP
FORMFIT® GEL ANKLE STIRRUP

ÖSSUR

Ossur hf.
Grjothals 1-5
110 Reykjavik
Iceland

CE
UK CA

www.ossur.com

IFU 1182_001 Rev. 3

©Copyright Ossur 2022